

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

Circonscription  
PROVENCE, ALPES, CÔTE D'AZUR, CORSE  
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA  
LUCCIANA - 20290 BORGIO -

☎ (95) 36.05.70



## Edition Speciale Corse

Bulletin Technique n° 44

du 6 Novembre 1984.

### TRAITEMENT D'AUTOMNE DES ARBRES FRUITIERS

#### \* CHANCRE EUROPEEN DU POMMIER

Supprimer les chancres au sécateur et effectuer un traitement cuprique à 500 g de cuivre métal / hl dès la chute du premier tiers des feuilles.

A renouveler après la chute totale des feuilles, si des pluies sont intervenues.

Chancre



#### \* TAVELURE DU POMMIER ET DU POIRIER

Effectuer un traitement après récolte, avant la chute des feuilles, à base de :

- Urée (46 % d'Azote) à raison de 120 Kg/ha.
- Bitertapol 25 g de matière active/hl (0,100 Kg de BAYCOR 25/hl).
- Fénarimol - 4 g de matière active/hl (0,100 l de RUBIGAN/hl)

Si vous utilisez ces 2 derniers produits maintenant, il faudra éviter d'employer systématiquement ces 2 matières actives en préventif au cours de la prochaine campagne.

#### \* CLOQUE DU PECHER ET DE L'AMANDIER

Dès la fin de la chute des feuilles, effectuer un traitement cuprique à la dose de 500 g de cuivre métal/hl. Ce traitement n'est que le complément de celui à effectuer en pré-débourrement en 1985.

#### \* CORYNEUM, CYLINDROSPORIOSE, CHANCRES DU CERISIER

#### \* CORYNEUM, CLOQUE DU PRUNIER

1 à 2 interventions au cours de la chute des feuilles avec une bouillie cuprique à la dose de 250 g de Cuivre métal/ha. Cette dose peut être portée à 500 g en fin de chute des feuilles sur bois bien aoutés.

Cloque



\*\*\*\*\*  
\* Intervenez avec du Cuivre par temps sec, sur bois bien aouté, pour éviter tout \*  
\* risque de phytotoxicité. \*  
\*\*\*\*\*

128

## CULTURES MARAICHÈRES

\* ATTENTION, les LIMACES sont présentes dans de nombreuses cultures

Utilisez les produits à base de :

- Métaldhyde 15 à 30 kg/ha
- Mercaptodiméthur : MESUROL anti-limaces 3kg/ha.



### \* APIONS DE L'ARTICHAUT

Les populations sont nombreuses dans le secteur de la MARANA. Dès réception du Bulletin, vous pouvez traiter avec :

- |                 |                                 |                 |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| - Endosulfan    | THIODAN AGROPHYTE, INSECTOPHENE | délai 15 jours. |
| - Mévinphos     | NOMBREUSES SPECIALITES          | " 7 jours.      |
| - Deltaméthrine | DECIS                           | " 0 jour.       |

\* SCLEROTINIA et BOTRYTIS de la LAITUE restent des maladies fréquentes.

Utilisez les matières actives suivantes :

- |                 |                  |                                 |
|-----------------|------------------|---------------------------------|
| - Iprodione     | 750 g M. A./ha   | ROVRAL                          |
| - Vinchlozoline | 750 g M. A./ha   | RONILAN                         |
| - Procymidone   | 750 g M. A./ha   | SUMISCLEX                       |
| - Thirame       | 3.500 g M. A./ha | poudrage NOMBREUSES SPECIALITES |

\*\*\*\*\*  
\* Eliminer les sujets atteints. Si nécessaire, renouveler le traitement une \*  
\* dizaine de jours après. Arrêter tout traitement au stade 16 feuilles \*  
\*\*\*\*\*

## C O L Z A

Les levées du Colza se poursuivent. Surveillez les attaques de limaces et d'Altises.

## A G R U M E S

Un traitement généralisé doit être effectué d'urgence, contre les Cicadelles, s'il n'a été déjà réalisé.

-----

(C) copyright : SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX 1984 - Toute reproduction même partielle, est soumise à notre autorisation.

-----